



NOMBRE COMERCIAL

CARICEF, KEFOL, KURGAN, NEOFAZOL, TASEP, ZOLIVAL.

GRUPO FARMACOLÓGICO

Antibiótico Bactámico, del grupo de las cefalosporinas (1ª generación).

PRESENTACIÓN

Vial liofilizado de 500mg IM y de 500mg, 1g o 2g IV + API.

ESTABILIDAD

Reconstituído: 24h a temp ambiente y 96h en nevera.

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTO

SÍ

Diluir hasta 10-20ml y admin. en 3-5 min.

IV INTERMITENTE

SÍ

Diluir en 50ml (1g) o en 100ml (2g) y admin en 15-30 min.

PERF CONTINUA

NO

IM

SÍ

SUBC.

NO

DILUCIONES

Se puede diluir en SF o SG5%.

OBSERVACIONES

Riesgo teratogénico en embarazo – Categoría B. Fotosensible.

MIDAZOLAM



NOMBRE COMERCIAL

DORMICUM.

GRUPO FARMACOLÓGICO

Hipnótico, sedante, ansiolítico y anticonvulsivante derivado de las benzodiazepinas.

PRESENTACIÓN

Ampolla de 5mg/5ml o 15mg/3ml.

ESTABILIDAD

Diluido: 24h a temp ambiente.

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTO

SÍ

IV INTERMITENTE

NO

Sin diluir, admin. lentamente.

PERF CONTINUA

SÍ

IM

SÍ

SUBC.

SÍ

Diluir y admin. según protocolo unidad y respuesta del paciente.

Paliativos.

DILUCIONES

Se puede diluir en SF o SG5%.

OBSERVACIONES

Riesgo teratogénico en embarazo – Categoría D. ¡¡Fármaco de riesgo!!: disponer de equipo de reanimación, monitorizar constantes vitales. Fotosensible. Se admite la vía intranasal. ANTÍDOTO: Flumazenilo.

ESCALA DE AGITACIÓN-SEDACIÓN DE RICHMOND (RASS)

Rango 1 a 4 ansiedad-agitación

- +4 Combativo.** Ansioso, violento.
- +3 Muy agitado.** Intenta retirarse catéteres, TET...
- +2 Agitado.** Movimientos frecuentes, lucha con respirador.
- +1 Ansioso.** Inquieto, pero sin conducta violenta o movimientos excesivos

Rango 0 a -3 sedación moderada-consciente

- 0 Alerta y tranquilo**
- 1 Adormilado.** Despierta con la voz, mantiene ojos abiertos + de 10 seg
- 2 Sedación ligera.** Despierta con la voz, mantiene ojos abiertos - de 10seg
- 3 Sedación moderada.** Se mueve y abre los ojos a la orden.

Rango -4 a -5 sedación profunda

- 4 Sedación profunda.** No responde, abre los ojos al dolor.
- 5 Sedación muy profunda.** No hay respuesta.

ESCALA DE NORTON MODIFICADA

Escala de valoración del Riesgo de Úlceras por Presión

	4 puntos	3 puntos	2 puntos	1 punto
ESTADO FÍSICO	Bueno	Mediano	Regular	Muy malo
ESTADO MENTAL	Alerta	Apático	Confuso	Estuporoso o comatoso
ACTIVIDAD	Ambulante	Disminuida	Muy limitada	Inmóvil
MOVILIDAD	Total	Camina con ayuda	Sentado	Encamado
INCONTINENCIA	Ninguna	Ocasional	Urinaria o fecal	Urinaria y fecal

Clasificación de riesgo:

Puntuación de 5 a 9 - Riesgo muy alto

Puntuación de 10 a 12 - Riesgo alto

Puntuación de 13 a 14 - Riesgo medio

Puntuación mayor de 14 - No hay riesgo

LABORATORIO (orden de llenado)



1^o

Hemocultivo

(Si extracción con palomilla: 1º aeróbico, 2º anaeróbico)
(Si extracción con jeringa: 1º anaeróbico 2º aeróbico)

Área: Microbiología

Inversiones: 5 veces



2^o

Citrato de sodio

Área: Coagulación

Inversiones: 4 veces



3^o

Tubo seco, sin activador de coagulación

Área: Bioquímica, banco de sangre, serología

Inversiones: 5 veces



4^o

Heparina de sodio/litio

Área: Bioquímica

Inversiones: 8 veces



5^o

EDTA-K

Área: Hematología, banco de sangre

Inversiones: 8 veces



6^o

Citrato VSG

Área: Hematología

Inversiones: 5 veces



7^o

Heparina de litio

Área: Bioquímica

Inversiones: 5 veces

El color del tapón puede variar según la casa comercial y el centro sanitario.